


## 2012-2016年 儿童药物中毒医院数据报告

### 一. 全国两家儿童医院儿童用药安全现状

统计数据来源：2012-2016年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心及首都医科大学附属北京儿童医院门急诊药物中毒监测数据


#### 1. 儿童药物中毒趋势

- 2012-2016年间，药物中毒在所有中毒中的占比呈下降趋势。



#### 2. 各年龄段儿童药物中毒情况

- 2012-2016年，儿童药物中毒主要集中在4岁及以下的年龄段儿童中；其中，这5年中，1-4岁儿童药物中毒呈上升趋势。



## 二. 上海儿童用药安全情况

统计数据来源：2012—2016年上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心门急诊药物中毒监测数据。


### 1. 上海儿童药物中毒变化趋势

- 5年间，儿童因药物中毒的病例数持续上升；2016年，相当于平均每2天发生一例。




### 2. 上海儿童药物中毒原因分析

- 5年间，儿童自己误服、成人导致的误服和过度剂量是儿童药物中毒的前三大原因，儿童自己误服占比最高，占81.4%。





- 5年间，儿童药物中毒前三大原因中，增速最快为过度剂量；2016年是2015年的2.6倍。



2.6倍  
2016 vs 2015


### 3. 上海各年龄段儿童药物中毒情况

- 5年间，在0-14岁儿童中，**1-4岁年龄组**是发生药物中毒最多的年龄段，占81.4%。



### 4. 上海儿童药物中毒药物分析

- 5年间，导致上海儿童药物中毒的前三类药：感冒药、精神药物与高血压药物



### 三、来自临床上的案例：

- **儿童自己服药导致超剂量：**

去年，一位12岁女孩因注意力不集中，于上海儿童医学中心儿保科就诊，诊断为ADHD，医师处方给予盐酸哌甲酯缓释片（专注达）治疗（每日1次，每次1粒，18mg/粒），回家后患儿自行服药，一次误服盐酸哌甲酯缓释片15粒，高于常规剂量15倍。

- **放置不当误服：** 家长药物放置不当，造成低龄儿童误服成人用药物，包括安眠药物，精神药物等
- **儿童自己误服：** 由于口味甜美吸引低龄儿童，造成低龄儿童超剂量服用甜味药物，包括果味感冒糖浆，甜味的中成药等

###

以上数据由全球儿童安全组织提供。联系人：m cui@safekidschina.org